

Fig. 1. 25°04,8' S - 46°55,7' E. D = 5 mm. Disque portant quelques minuscules granules sur les boucliers radiaires, ainsi que de longs piquants graciles, échinulés, sur ses bords ; bras n'ayant que quelques petits granules sur la première plaque dorsale.

Fig. 2. Banc de l'Étoile, 20 - 80 mètres. D = 4 mm. Disque et bras sans granules, mais présence de gros piquants coniques, lisses, en bordure du disque.

Fig. 3. Nosy Be, 30 mètres. D = 5 mm. Bras sans granules, ainsi que le disque qui porte, en surface, quelques gros piquants coniques, lisses.

Fig. 4. Golfe Persique, 38 mètres. D = 5 mm. Bras couverts partiellement de granules. Disque portant quelques petits granules, surtout sur les boucliers radiaires, granules plus gros en bordure où ils sont accompagnés de minces piquants échinulés.

Fig. 5. Tuléar, dans Éponges et Alcyonaires. D = 4 mm. Disque portant des granules rugueux, plus gros sur les plaques séparant les boucliers radiaires de chaque paire, et qui s'allongent sur la bordure ; bras couverts partiellement de granules.

Fig. 6. Canal de Mozambique, 7 mètres. D = 9 mm. Bras entièrement couverts de petits granules ; disque également couvert de granules identiques, ainsi que de nombreux longs piquants coniques, lisses.

OBSERVATIONS. — Les exemplaires du British Museum (N. H.) récoltés par H.M.S. «Alert» à l'île Marie-Louise, groupe des Amirantes, sont semblables l'un à celui de la figure 2, l'autre à celui de la figure 3.




PLANCHE X

Ophiarthrum elegans Peters (D = 17 mm). -- 1 : face dorsale ; 2 : face ventrale.
Ophiocoma brevipes Peters (D = 16 mm). -- 3 : face dorsale ; 4 : face ventrale.
Ophiocoma erinaceus Müller et Troschel (D = 25 mm). -- 5 : face dorsale ; 6 : face ventrale.




PLANCHE XI

Ophiomastix koehleri Devaney (D = 18 mm). — 1 : face dorsale ; 2 : face ventrale.
Ophiocoma pusilla (Brock) (D = 5 mm). — 3 : face dorsale ; 4 : face ventrale.
Ophiocoma pica Müller et Troschel (D = 11 mm). — 5 : face dorsale ; 6 : face ventrale.




PLANCHE XII

Ophiocoma scolopendrina (Lamarck) (D = 23 mm). — 1 : face dorsale ; 2 : face ventrale.
Ophiocoma valenciae Müller et Troschel (D = 13 mm). — 3 : face dorsale ; 4 : face ventrale.
Ophiocomella sexradia (Duncan) (D = 4 mm). — 5 : face dorsale ; 6 : face ventrale.




PLANCHE XIII

Ophiomastix bispinosa H.L. Clark (D = 8 mm). — 1 : face dorsale ; 2 : face ventrale.
Ophiomastix caryophyllata Lütken (D = 18 mm). — 3 : face dorsale ; 4 : face ventrale.
Ophiomastix palaoensis Murakami (D = 17 mm). — 5 : face dorsale ; 6 : face ventrale.




PLANCHE XIV

Ophiomastix venosa Peters (D = 27 mm). — 1 : face dorsale ; 2 : face ventrale.
Ophiopsila timida Koehler (D = 5 mm). — 3 : face dorsale ; 4 : face ventrale.
Ophioneroides granum n. sp. (D = 3 mm). Holotype. — 5 : face dorsale ; 6 : face ventrale.




PLANCHE XV

Ophiopsila paucispina Koehler (D = 11 mm). — 1 : face dorsale ; 2 : face ventrale.
Ophiochaeta crinita n. sp. (D = 4 mm). Holotype. — 3 : face dorsale ; 4 : face ventrale.
Ophiarachnella gorgonia Müller et Troschel (D = 13 mm). — 5 : face dorsale ; 6 : face ventrale.




PLANCHE XVI

Ophiarachnella septemspinosa (Müller et Troschel) (D = 17 mm). — 1 : face dorsale ; 2 : face ventrale.
Ophioconis cupida Koehler (D = 4 mm). — 3 : face dorsale ; 4 : face ventrale.
Ophioconis permixta Koehler (D = 2,5 mm). — 5 : face dorsale ; 6 : face ventrale.




PLANCHE XVII

Ophiopeza fallax Peters (D = 11 mm). — 1 : face dorsale ; 2 : face ventrale.
Ophiopeza spinosa (Ljungman) (D = 7 mm). — 3 : face dorsale ; 4 : face ventrale.